Вор в глубокой превности в различных областях иницической маршины с успеком применалось мумис.

Волиние ученые того времени Арнотоголь, Абу-Анинен-сина /Авитема/ и др. опиозвали вноства целебные овойотва муние в способи его применения при заболаваниях серпра мелуджа, дикательных путей, наржиой системи оприс-дангатального аппарата. В настоправ премя в меррилине короло навестно, что самые тикалия переломы различных суставов и ностай с помощью мумие срастаются в два раза бистрее обичного. При этом неимочается опастность заражения прош и развичия остобималита. Трудоспособность востанавливается пояностью. Израстно такжа и то, что мумиа применяется при полосиие личак, пароличак, мигрени, ограниенияк, тубаркулаза, клабева, отоложино, фурункулёве. Мумий усневно лечит гострит, лизу колудка болежи валиного и мочевого пувира, применяется при отражения ядами укуса жай и окоримонов, при заболевании коми, ослезінии, непереници мочи, при вызихах ужибах и тропилах. Муний улучнает бунивно начени при гостратах, устраняет слади равизтических про-Decora Homanisjer pacory Bnyrpannax opranos, yoummaer winepone ный осмон в организма, улучшает нарчину прови, мушь рассасивает ткандиме уплотнения и закупорки, коромо лечит запори, овоги, ранк осанин, оснащает сильным тонизпруским дейстинем, уналичивает потанция. В большистве случаев сугочный присм мумый внутрь сосvавляет от 0,2 до 0,3 грамма в виде раствора. Раствор составляетс на воде, спарте или моломе. Можно применять пещество и сумим это особенно рекомендуется при заболеваниях носоглотии и при дезинфицировании полоски реа. При заболеваниях кожи и повреждениях об. мумил на больное место в виде размитериной пластина, мами или нарменого тампона, оноченного в растворе. Музий можно втирать в нову /лучие со спертом/, делать различние ванны горичие и теплие. полоскания, произвания. Процентное содаржание вещества в растворе при этом нолеблется от 1% до 10%. Г гр. на 100 мл. воды «Тураство po.

TORARAHUR II HORFFOREA

ЗАБОЛЬВАНИЕ ЗАБОЛЕВА. перевоми постей, лави, громборлебити, запори, нервине заболевания, сердечные заболевания, общее педомогания пложой анистит для верослых из расчета 0,2 - 0,3 гр. в сутии. Растворить в одном литре горичей воды киначеной 2-3 гр. вещества. Принциять по ТОО гр. раствора в течение ТО дней за 30 мин. до завтрема. После перерыва 5-ТО дней куро лечения повторить. примы и почем 7 гр. напрочен растнорить в 3 литрак воды. Принамочь по I станану 3 раза и день за 30 мин до еды.

САХАВНА ЛИАБЕТ. 2 гр. на I л. воды. Принимать 2 раза в день /до завирона и перед спом/ по 100 мл. раствора в точение Годией. Курс повторить 3-4 раза с перерыюм в 5 дией.

<u>Глоукома</u> помнимать по 0,3 гр. 2-3 раза в дань до едн. Запимать сванольным соном.

ПРИ ПУЛНООЙ КИСЛОТНОСТИ I гр. на I л. нопи. Пить по степену З раза в день до еди.

PEMATMAN nemumara nocrommo /до улучшения/ из расчета
0.2 гр. в сутил, натоши. Смазивата сустави 10%-15% раствором.
Накладивата повяжи.

<u>ПАРАЛОМОЗ</u> З гр. на отакан воды. Полоскать не прогламиван.

<u>НАМИИ ИЗЕЧНОГО ПУЗИРН</u> І гр. на І л. воды. Пать 3 раза в день но отакану до выздоровления.

<u>ШСТИГ</u> 3 гр. на стакан киняченой воды. Делать спринцевание до приежования болей /5-10 мин/.

РАНИ. ОПУКОЛИ. ОМОГИ Проминать, областвать, делать компресси 3-8 раза в день /утром и на ночь обязательно/ по полного виздоровления. Компентрация раствора от 15 до 156 / 1 гр. на 100мл.-15/. Можно применеть мумий в размятельном виде не растворял.

эрозы матон 5 гр. на отакан каначеной води. Такионпровать на ночь.

<u>ГОЛОЖИЛ ВОЛИ</u> и I столовой ложие горичей воды растворить 2гр. шумий. Раствором законивать в нее по 3-5 капаль.

<u>БУРУБУЛИЗ.чиная. ПРИМ</u> пить из расчета 0,2 гр. в сутим нато∕е шам / за 30 мин. до запирака/. Накладивать на большо места в пида помирессов из 10-15% раствора или в видо размитчения лапешем.

РАМЕСУЛИТ 10-15% раствор втирать в сольные места /желательно со симпидаром на ночь/.

CYTOSHULL HUNGRI ROWER CHUTCHS

Ann meren : or 3 mecames no I roma 0.01 - 0.02 rp.
or I roma no 9 mer 0.05 rp.
or 9 mer no 14 mer 0.1 rp.